

MAXİTOR NPK serisi:

Maxitor NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. Soilmaster NPK serisinde yer alan 7 farklı formülasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Maxitor NPK ürün grubu tamamen suda eriyebilir formdadır. Üretiminde kullanılan hammaddeler yüksek kaliteli olup, içeriğinde herhangi ağır metal ihtiva etmemektedir. Maxitor NPK ürün grubunun formülasyonların' da tamamen EDTA ile şelatlı ve bitkiler tarafından alınabilir formda mikro elementleri içermektedir. Düşük EC ve pH değerine sahip olması nedeniyle; bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilir formdadır. Ayrıca formülasyonuna bağlı olarak değişen oranlarda kükürt içeriğinden dolayı bitki kök bölgesinin pH' sı üzerine olumlu etki sağlayarak, mikro elementlerin bitkiler tarafından alınmasına yardımcı olmaktadır.

Maxitor NPK serisi 7 farklı formülasyona sahiptir. Bunlar;

15-30-15 + 5 SO₃ + TE

Fosfor ağırlıklı bu formülasyondur. Bitkinin ilk dönemlerinde kök gelişimini teşvik etmesi, fosforu depolaması ve çiçek döneminde sağlıklı çiçek oluşması için tercih edilebilir. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılar.

16-8-24 + 2MgO + 2 SO₃ + TE

Azot ve potasyum ağırlıklı bir formülasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin irileşmesine, dolgun ve sert olmasına, iyi renklenmesine yardımcı olarak bitkide kaliteli meyve oluşumunu hedef alan bir formülasyondur. Hasat sonuna kadar kullanılabilir.

16-6-31+ 2 MgO + 2 SO₃ + TE

Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiştiriciliğini teşvik ettiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.

18-18-18 + 9 SO₃ + TE

Bitkinin her döneminde kullanılabilen, azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını yüksek oranda karşılayan ve ileri dönemlerinde bol çiçek açması istenen bitkilerde ihtiyacı karşılayabilmek için standart bir formülasyondur.

20-20-20 + TE

Kesme çiçekler ve yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu bitkilerde yumru gelişimi başlangıcında kullanılabilir. Soğuk dönemlerde biber, hıyar bitkisinin yeşil aksamının güçlenmesine yardımcı olur.

20-10-20 + 11 SO₃ + TE

Bitkide sađlıklı yeřil aksam oluřumunu, kklenmeyi ve ieklenmeyi teřvik eder. Bitkilerin fosfor ihtiyacı yksek olan gen dnemlerinde uygulanır.

10-0-40 + 2 MgO

Meyvelerin bymeye bařladıđı dnemden itibaren uygulanan potasyum ađırlıklı bir gbredir. Meyve geliřimini teřvik eder, atlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiřtiriciliđini teřvik ettiđi gibi bitkinin geliřmesi iin gereken azotu da ihtiva eder. Bitkilerin hastalıklara karřı direncinin artmasına yardımcı olur.

Detaylı bilgi iin Toros Tarım uzman personellerine danıřınız.

Maxitor NPK serisi ierik bilgileri ařađıdaki gibidir.

MAXİTOR w/w%	15.30.15	16.06.31	16.08.24	18.18.18	20.10.20	20.20.20
Nitrat azotu (NO₃)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amonyak azotu (NH₄)	7,8	0,5	5,0	6,7	5,9	2,9
re azotu (NH₂)	7,2	15,5	11,0	11,3	14,1	17,1
Toplam Azot	15,0	16,0	16,0	18,0	20,0	20,0
Fosfor (P₂O₅)	30,0	6,0	8,0	18,0	10,0	20,0
Potasyum (K₂O)	15,0	31,0	24,0	18,0	20,0	20,0
Magnezyum (MgO)	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Kkrt (SO₃)	5,4	1,9	2,5	8,9	11,3	0,0
inko (Zn EDTA)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Demir (Fe EDTA)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Mangan (Mn EDTA)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Bakır (Cu EDTA)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Bor (B)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Molibden(Mo)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001