

# TOROS CALMAG

13-0-0 + 16(CaO) + 6(MgO)

Kalsiyum Magnezyum Nitrat

SUDA TAMAMEN ÇÖZÜNÜR

## TOROS CALMAG

- Kalsiyum ve Magnezyumu bir arada içerir.
- İçeriğindeki Kalsiyum ve Magnezyum; Amonyum, Fosfat ve Sülfat kaynaklı alımı engelleyen olumsuzluklardan etkilenmez.
- Sebze, meyve ve çiçeklerin raf ömrünün uzamasını destekler.
- Çiçek burnu çürüklüğü ve acı benek bozukluğu oluşmamasına yardımcı olur.
- İçeriğindeki Magnezyum sayesinde bitki fotosentez faaliyetinin artmasına yardımcı olur.
- Klorofil sentezini artırarak yaprakların yeşil rengini korumasına yardımcı olur.
- Damla sulama ve yapraktan uygulamaya uygundur.
- Tek veya ayrı bir tankta eritilerek uygulanması önerilir.



**TOROS TARIM**

[www.toros.com.tr](http://www.toros.com.tr)

TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.



| BİTKİ   | YAPRAKTAN   | TOPRAKTAN / DAMLA SULAMA  |
|---|---|---|
| <b>Domates (Tarla-Sera)</b>                     | Meyve tutumundan hasada kadar 4-5 defa 100 litre suda 300-600 gr eritilerek uygulanır.  | Fide-Çiçeklenme Dönemi: 200 gr/da/gün   |
|   |   | Çiçek-Meyve Tutumu: 300 gr/da/gün   |
|   |   | Meyve Tutumu-Hasat: 1 kg/da/gün   |
|   |   | Açıkta Yetiştiricilik: Ara çapada 10 kg/da  |
| <b>Tarla Sebzeleri</b>                          | 100 litre suda 300-600 gr eritilerek gelişme döneminde 2-3 defa 10-15 gün ara ile uygulanır.  | Açıkta Yetiştiricilik: Ara çapada 10 kg/da  |
| <b>Kavun ve Karpuz</b>                          | Çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve irileşmesinde 100 litre suda 300-600 gr eritilerek yapraktan üç defa uygulanır.   | Açıkta Yetiştiricilik: Ara çapada veya ilk sulamada 10 kg/da verilmelidir.                      |
| <b>Patates</b>                                  |   | Ara çapalamada 15 kg/da ve ilk su ile 10 kg/da verilmelidir.                                    |
| <b>Elma</b>                                     | Meyve tutumunda ve meyveler ceviz iriliğinde iken 100 litre suda 300 gr; meyve irileşmesi ve renk dönüm öncesi 100 litre suda 600 gr eritilerek uygulama yapılır. | Meyve Tutumu: 300 gr/da/gün   |
|   |   | Meyve İrileşmesi: 1,5 kg/da/hafta   |
|   |   | Topraktan uygulamada ilk üst gübreleme ile birlikte sulama tavası içinde 25 kg/da verilmelidir. |
| <b>Tütün</b>                                    | 100 litre suda 300 gr eritilerek, gelişme dönemi içinde 15 gün ara ile iki defa uygulanmalıdır.   |   |
| <b>Hıyar (Sera)</b>                             | Çiçeklenme-hasat döneminde 2-3 defa 100 litre suda 300-600 gr eritilerek uygulama yapılır.  | Fide-Çiçeklenme Dönemi: 200 gr/da/gün   |
|   |   | Meyve Tutumu-Hasat: 1 kg/da/hafta   |
|   |   | Topraktan İlk Sulamada: 15 kg/da  |
| <b>Çilek</b>                                    | 100 litre suda 400 gr eritilerek, fide dönemi ve meyve tutum döneminde uygulanmalıdır.  | Haftada bir damla sulama ile 1,5-2 kg CALMAG verilmelidir.                                      |
| <b>Fındık</b>                                   |   | İlk üst gübre ile birlikte 15 kg/da verilmelidir.   |
| <b>Çeltik</b>                                   |   | Yabancı ot ilaçlamasından sonra ilk üst gübre ile 10 kg/da verilmelidir.                        |
| <b>Biber (Yağlık)</b>                           | 100 litre suda 300-600 gr eritilerek çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve irileşmesi olmak üzere üç kez uygulanmalıdır.  | Fide Dönemi: 200 gr/da/gün  |
|   |   | Çiçeklenme-Meyve Tutumu: 400 g/da/gün   |
|   |   | Meyve Tutumu-Hasat: 1,5 kg/da/hafta   |
|   |   | Ara çapada 10 kg/da ve ilk suda 10 kg/da verilmelidir.  |
| <b>Hıyar (Kornişon)</b>                         | 100 litre suda 300-600 gr eritilerek gelişme döneminde iki hafta ara ile 2-3 defa uygulanır.  | Fide Dönemi-Hasat Başlangıcı: 2 kg/da/hafta   |
|   |   | Hasat Dönemi: 1,5 kg/da/hafta   |
|   |   | Ara çapalamada 5 kg/da, ilk suda 5 kg/da ve üçüncü sulamada 5 kg/da verilmelidir.               |
| <b>Marul / Lahana / Havuç Kereviz / Enginar</b> | Fide döneminde 100 litre suda 200 gr, gelişme döneminde 100 litre suda 400-600 gr eritilerek uygulama yapılır.  | Ara çapalamada veya ilk sulamada 10 kg/da verilmelidir.   |

- Fidan yaşına göre uzman ekibimizden bilgi alarak gübre kullanınız.
- Dönem gübre miktarı, dönemdeki sulama adedine bölünerek uygulanır.
- Öneriler sadece bir örnektir. Toros Tarım uzmanlarına danışarak ve toprak analizine göre gübre kullanınız.

- Gübreleme programı için uzman ekibimizden bilgi alınız.
- Taban gübre (toprak altı) kullanmayı unutmayınız.
- Her sulamada gübre kullanınız.



**TOROS TARIM**

www.toros.com.tr

TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.